ГБОУ «Гимназия Назрановского Района» с.п.Али-юрт,
Республика Ингушетия
Ф.И.О: Татриева Елизавета Ахмедовна, ученица 11 класса
Телефон: +7(928)791-79-39
Электронная почта: tatrieva_liza@mail.ru
Научный руководитель: Хашиев Муса Туганович
Телефон: +7(962)639-77-55
Электронная почта: katayama123@mail.ru

«ЗооСловарь»

Небольшой универсальный справочник, охватывающий представителей фауны Республики Ингушетии. Название на русском языке, его аналог на ингушском. Иллюстрации и краткое описание, интересные факты к каждому животному, представленных в алфавитном порядке.

ПРИМЕЧАНИЯ

- *Ударение во всех словах на ингушском языке падает на первый слог*.
- Слова в скобках после названия – его аналог на ингушском языке.

ВОЛК (БОРЗ) – ПОХОЖ НА БОЛЬШУЮ, ДЛИННОНОГУЮ СОБАКУ С ХВОСТОМ, ОПУЩЕННЫМ ВНИЗ. ОДНАКО ИМЕЕТ ОТЛИЧИЯ: ХУДОЩАВОЕ ТУЛОВИЩЕ, БРЮХО ПОДТЯНУТО, НОГИ ТОНКИЕ, ХВОСТ ПОКРЫТ ДЛИННОЙ ШЕРСТЬЮ И ВИСИТ ДО ПЯТОК. ВОЛК ЖИВЕТ КАК НА ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ВЫСОТЕ В ГОРАХ, ТАК И В НИЗМЕННОСТЯХ, ДЕРЖИТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В МАЛОНАСЕЛЕННЫХ И СПОКОЙНЫХ ПУСТОШАХ, В ЛЕСАХ, В СТЕПЯХ. ВОЛК СИЛЕН, НАСТОЙЧИВ, У НЕГО ОТЛИЧНО РАЗВИТЫ СЛУХ, ЗРЕНИЕ, ОБАЯНИЕ, КРОМЕ ТОГО ОН УМЕН. ЧУВСТВУЕТ ЗАПАХ НА БОЛЬШОМ РАССТОЯНИИ. ТАКЖЕ, КАЖДЫЙ ВОЛК ИМЕЕТ СВОЮ, ТОЛЬКО ЕМУ СВОЙСТВЕННУЮ ОСАНКУ.

ВОРОБЬИ(ВИРХЬАЗИЛГ) – СЕМЕЙСТВО НЕБОЛЬШИХ ОСЕДЛЫХ, РЕЖЕ КОЧЕВЫХ, ПТИЦ ИЗ ОТРЯДА ВОРОБЬИНООБРАЗНЫХ. ИМЕЮТ КОРОТКИЕ НОГИ, МНОГИЕ ВИДЫ ПО ЗЕМЛЕ ПЕРЕДВИГАЮТСЯ ПРЫЖКАМИ. ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА ВОРОБЬЁВ — СКЛОННОСТЬ К СИНАНТРОПИЗАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОЙ ВОРОБЬИ СТАЛИ ПОСТОЯННЫМИ СПУТНИКАМИ ЧЕЛОВЕКА. ОТНОШЕНИЕ К ВОРОБЬЯМ У ЧЕЛОВЕКА ВАРЬИРУЕТ ОТ ВЕСЬМА ПОЗИТИВНОГО DO НЕГАТИВНОГО.

ВОРОН (КЪАЙГ) — ОСТОРОЖНАЯ ПТИЦА. УМЕЕТ ХОРОШО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ПО ЗЕМЛЕ. ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПОДНЯТЬСЯ НА КРЫЛЬЯ, ВОРОН ДЕЛАЕТ НЕСКОЛЬКО ПРЫЖКОВ. ПОЛЁТ ВОРОНА БОЛЬШЕ ПОХОЖ НА ПОЛЁТ ХИЩНОЙ ПТИЦЫ, ЧЕМ НА ПОЛЁТ ДРУГИХ ВРАНОВЫХ. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ВОРОНА В ДИКОЙ ПРИРОДЕ СОСТАВЛЯЕТ 10—15 ЛЕТ. В НЕВОЛЕ ЭТИ ПТИЦЫ МОГУТ ПРОЖИТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОЛЬШЕ. В ЛОНДОНСКОМ ТАУЭРЕ ВОРОНЫ ЖИЛИ НА ПРОТЯЖЕНИИ БОЛЕЕ 40 ЛЕТ. ВОРОНА МОЖНО ВСТРЕТИТЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ГОДА НА ЛАНДШАФТАХ САМОГО РАЗНОГО ТИПА. ЗИМОЙ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ РЯДОМ С ЖИЛЬЁМ ЧЕЛОВЕКА И НА СВАЛКАХ. ВЕДЁТ ОСЕДЛЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. ВОРОН — ВСЕЯДНАЯ ПТИЦА, ПОЭТОМУ РАЦИОН ВОРОНА РАЗНООБРАЗЕН. ГЛАВНОЕ МЕСТО В ПИТАНИИ ЗАНИМАЕТ ПАДАЛЬ, КОТОРОЙ ВОРОН КОРМИТСЯ НА СВАЛКАХ И У СКОТОБОЕН. В ЭТОМ ОТНОШЕНИИ ВОРОН ВЫСТУПАЕТ КАК САНИТАРНАЯ ПТИЦА.

ГОЛУБЬ (КХОКХ) - ОБЛАДАЯ ПРЕКРАСНЫМ ЗРЕНИЕМ, ПТИЦА СПОСОБНА РАЗЛИЧАТЬ НЕ ТОЛЬКО ЦВЕТА РАДУГИ, НО ТАКЖЕ И УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ЛУЧИ. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ, ГОЛУБИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ. СЛУХ ПОЗВОЛЯЕТ УЛАВЛИВАТЬ ЗВУКИ ГОРАЗДО БОЛЕЕ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ, ЧЕМ В СОСТОЯНИИ УСЛЫШАТЬ ЧЕЛОВЕК — НАПРИМЕР, ШУМ ВЕТРА ИЛИ ОТДАЛЁННЫЕ ЗВУКИ ГРОЗЫ. ХОРОШО ИЗВЕСТНА СПОСОБНОСТЬ СИЗЫХ ГОЛУБЕЙ ВСЕГДА НАХОДИТЬ ПУТЬ ДОМОЙ, ГДЕ БЫ ОНИ НИ НАХОДИЛИСЬ — ТАКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ИЗДРЕВЛЕ ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ ЧЕЛОВЕКОМ ДЛЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ. ОБЛАДАЮЩИЕ ТАКИМ КАЧЕСТВОМ ПТИЦЫ СПОСОБНЫ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ДО 1000 КМ В ДЕНЬ. ГОЛУБИ ЧАСТО РАССМАТРИВАЮТСЯ КАК ДОСТАТОЧНО РАЗВИТЫЕ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ПЛАНЕ ПТИЦЫ.

ГУСИ (Г1АЖ) - ЖИВУТ НА ЛУГОВЫХ И БОЛОТИСТЫХ ПРОСТРАНСТВАХ, НЕКОТОРЫЕ НА БЕРЕГАХ МОРЕЙ; ХОРОШО ХОДЯТ И БЕГАЮТ; ЛЕТАЮТ БЫСТРО, НО ПЛАВАЮТ И НЫРЯЮТ ХУЖЕ УТОК. НА ВОДЕ НАХОДЯТСЯ ГОРАЗДО МЕНЬШЕ, ЧЕМ УТКИ И ЛЕБЕДИ, БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ЖИЗНИ ПРОВОДЯТ НА СУШЕ. ЛЕТЯТ ГУСИ НА ЗИМОВКУ И НА ГНЕЗДОВАНИЯ ОБЫЧНО ПО НОЧАМ НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ, ДОВОЛЬНО БЫСТРО. ПИТАЮТСЯ ПОЧТИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РАСТИТЕЛЬНОЙ ПИЩЕЙ, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ — ЗЕЛЁНЫМИ ЧАСТЯМИ РАСТЕНИЙ И СЕМЕНАМИ. С ПОМОЩЬЮ КЛЮВА, СНАБЖЁННОГО ОСТРЫМИ ЗУБЧИКАМИ ПО КРАЯМ, ОНИ ЩИПЛЮТ ТРАВУ, ЗЛАКИ, КАПУСТУ, ОБРЫВАЮТ ЛИСТЬЯ, ЯГОДЫ, СТРУЧКИ И КОЛОСЬЯ. КРОМЕ РАСТЕНИЙ НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ЕДЯТ ЕЩЁ И МЕЛКИХ ПОЗВОНОЧНЫХ И НАСЕКОМЫХ.

ДРОФА (ТОТАКХ)- ИЗДРЕВНА СЧИТАЛАСЬ «КНЯЖЕСКОЙ» ДИЧЬЮ, НА НЕЁ ЧАСТО ОХОТИЛИСЬ, НЕРЕДКО С ПОМОЩЬЮ ГОНЧИХ СОБАК И ЛОВЧИХ ПТИЦ. ПОПУЛЯРНЫМ ОБЪЕКТОМ ОХОТЫ ОНА СЧИТАЛАСЬ И В РОССИИ В XIX И ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКОВ. ПИТАЕТСЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ И ЖИВОТНОЙ ПИЩЕЙ — ТРАВАМИ, ЗЕЛЕНЬЮ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ, НАСЕКОМЫМИ, ИНОГДА ЯЩЕРИЦАМИ И МЫШЕВИДНЫМИ ГРЫЗУНАМИ. ГНЕЗДИТСЯ С АПРЕЛЯ ПО ИЮНЬ, В КЛАДКЕ — 1—3 ЯЙЦА ЖЕЛТОВАТОЙ, ЗЕЛЕНОВАТОЙ ИЛИ ГОЛУБОВАТОЙ ОКРАСКИ СО СЛОЖНЫМ РИСУНКОМ. У ВЗРОСЛЫХ ДРОФ НЕ ТАК МНОГО ЕСТЕСТВЕННЫХ ВРАГОВ. НА САМОК ИНОГДА НАПАДАЮТ ОРЛЫ (БЕРКУТ, СТЕПНОЙ ОРЁЛ, МОГИЛЬНИК) И ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ. ИЗ НАЗЕМНЫХ ХИЩНИКОВ ОПАСНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОБЫКНОВЕННАЯ ЛИСИЦА, КОРСАК, ВОЛК, БАРСУК, БРОДЯЧИЕ СОБАКИ И КОШКИ И, ВОЗМОЖНО, СТЕПНОЙ ХОРЁК.

ДЯТЕЛ (ХЕНАХ ЗІОКЪЕТАРГ) – ЭТО МЕЛКИЕ И СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ПТИЦЫ, ВЕДУЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ДРЕВЕСНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. ПИТАЮТСЯ НАСЕКОМЫМИ, КОТОРЫХ С ПОМОЩЬЮ КЛЮВА ДОБЫВАЮТ ИЗ-ПОД КОРЫ СТВОЛОВ ДЕРЕВЬЕВ. ЧЕРЕП ДЯТЛА ОТЛИЧАЕТСЯ БОЛЬШОЙ ВЕЛИЧИНОЙ И КРЕПОСТЬЮ. КЛЮВ ДЛИННЫЙ, ПРЯМОЙ И КОНУСООБРАЗНЫЙ. В КАЧЕСТВЕ ОПОРЫ ИСПОЛЬЗУЕТ КЛИНООБРАЗНЫЙ ХВОСТ. У ВСЕХ ВИДОВ ПЁСТРОЕ ЧЁРНО-БЕЛОЕ ОПЕРЕНИЕ, У БОЛЬШИНСТВА ТАКЖЕ ИМЕЮТСЯ КРАСНЫЕ И ЖЁЛТЫЕ ОТМЕТИНЫ НА ГОЛОВЕ И ДРУГИХ ЧАСТЯХ ТЕЛА. ГНЕЗДЯТСЯ В ДУПЛАХ, ВЫБИРАЯ МЁРТВЫЕ ЛИБО БОЛЬНЫЕ ДЕРЕВЬЯ.

ДЯТЛЫ ИНОГДА ИСПОЛЬЗУЮТ В КАЧЕСТВЕ БАРАБАНА ПУСТЫЕ КОНСЕРВНЫЕ БАНКИ И КУСКИ ЖЕЛЕЗА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИХ БАРАБАННАЯ ДРОБЬ ЗВУЧАЛА ДОСТАТОЧНО ДАЛЕКО: ТАК ОНИ ПРИЗЫВАЮТ К СЕБЕ ДРУГИХ ДЯТЛОВ.

КУНИЦА (СОАЛОР) – В ОТЛИЧИЕ ОТ СВОЕЙ РОДСТВЕННИЦЫ КАМЕННОЙ КУНИЦЫ, ЛЕСНАЯ КУНИЦА ИЗБЕГАЕТ ЛЮДСКИХ СЕЛЕНИЙ. ЛЕСНЫЕ КУНИЦЫ В ГОРАЗДО БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ОБИТАТЕЛИ ДЕРЕВЬЕВ, ЧЕМ ДРУГИЕ ВИДЫ КУНИЦ. ОНИ УМЕЮТ ХОРОШО ЛАЗАТЬ И ПРЫГАТЬ, ПРИ ЭТОМ ПРЕОДОЛЕВАЯ РАССТОЯНИЕ ДО 4 МЕТРОВ. ПРИ ЛАЗАНИИ ОНИ В СОСТОЯНИИ РАЗВОРАЧИВАТЬ СВОИ СТУПНИ НА 180°. УБЕЖИЩА СОЗДАЮТ НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В ДУПЛАХ, ИЛИ ЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ПОКИНУТЫЕ БЕЛИЧЬИ СООРУЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ГНЁЗДА ХИЩНЫХ ПТИЦ. В ЭТИ УБЕЖИЩА ОНИ УДАЛЯЮТСЯ ДЛЯ ОТДЫХА В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ, А В СУМЕРКАХ И НОЧЬЮ УХОДЯТ НА ПОИСКИ ДОБЫЧИ. ЛЕСНЫЕ КУНИЦЫ ВСЕЯДНЫ, НО ПРЕДПОЧИТАЮТ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ, А ТАКЖЕ ПТИЦ И ИХ ЯЙЦА. НЕ БРЕЗГУЮТ И ПРЕСМЫКАЮЩИМИСЯ, ЛЯГУШКАМИ, УЛИТКАМИ, НАСЕКОМЫМИ И ПАДАЛЬЮ. ОСЕНЬЮ ЧАСТЬЮ ИХ ПИЩИ МОГУТ БЫТЬ ФРУКТЫ, ЯГОДЫ И ОРЕХИ. ДОБЫЧУ ЛЕСНАЯ КУНИЦА УБИВАЕТ УКУСОМ В ЗАТЫЛОК. ПОЗДНИМ ЛЕТОМ И ОСЕНЬЮ ОНА НАКАПЛИВАЕТ И СКЛАДЫВАЕТ ЗАПАСЫ ПИЩИ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ВРЕМЕНИ ГОДА.

КАВКАЗСКИЙ УЛАР, ИЛИ КАВКАЗСКАЯ ГОРНАЯ ИНДЕЙКА (AЬКХА МОСКАЛ)— ПТИЦА РОДА УЛАРЫ, ОТРЯДА КУРООБРАЗНЫХ, ОБИТАЮЩАЯ НА КАВКАЗЕ. КАВКАЗСКИЙ УЛАР ЯВЛЯЕТСЯ РАСТИТЕЛЬНОЯДНОЙ ПТИЦЕЙ. ЖИВОТНЫЕ КОРМА НЕ ИГРАЮТ НИКАКОЙ РОЛИ В ПИТАНИИ УЛАРОВ. В ПИЩУ УПОТРЕБЛЯЮТ НАЗЕМНЫЕ ЧАСТИ АЛЬПИЙСКИХ РАСТЕНИЙ — ЛИСТЬЯ, СТЕБЛИ, МОЛОДЫЕ ПОБЕГИ, БУТОНЫ, ЦВЕТЫ, ПОЧКИ И СЕМЕНА. ВСЕГО В РАЦИОНЕ УЛАРА ОКОЛО 70 ВИДОВ РАСТЕНИЙ. В ОСНОВНОМ ЭТО ЗЛАКИ И ОСОКИ, БОБОВЫЕ И ГВОЗДИЧНЫЕ.

КАВКАЗСКИЕ УЛАРЫ НЕ НУЖДАЮТСЯ В ПОСТОЯННЫХ ИСТОЧНИКАХ ВОДЫ. ЕЁ ОНИ ПОЛУЧАЮТ ВМЕСТЕ С РАСТИТЕЛЬНОЙ ПИЩЕЙ. КАВКАЗСКИЙ УЛАР ЯВЛЯЕТСЯ НАЗЕМНОЙ ГОРНОЙ ПТИЦЕЙ, ПОЭТОМУ БЕГАЕТ ЛЕГКО И БЫСТРО ДАЖЕ ПО КРУТЫМ СКЛОНАМ, ПОЛЬЗУЯСЬ КРЫЛЬЯМИ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ РАВНОВЕСИЯ. ПРИ ОПАСНОСТИ БЕЖИТ К ОБРЫВАМ, ЧТОБЫ СПЛАНИРОВАТЬ В БЛИЖАЙШЕЕ УЩЕЛЬЕ. ПРИ ПОЛЁТЕ КАВКАЗСКИЙ УЛАР ОБЫЧНО ГРОМКО СВИСТИТ. ЗИМОЙ ПТИЦА ДОВОЛЬНО МОЛЧАЛИВА И СРАВНИТЕЛЬНО РЕДКО ПОДАЁТ ГОЛОС.

ЗАЯЦ (ПХЬАГАЛ)- ЖИВОТНОЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОДНОМУ ИЗ 2 СЕМЕЙСТВ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ОТРЯДА ЗАЙЦЕОБРАЗНЫХ. ГРЫЗУНЫ. ЖИВОТНОЕ С ВЫТЯНУТЫМ ТЕЛОМ, ДЛИННЫМИ ЗАДНИМИ НОГАМИ, ДЛИННЫМ ВЫТЯНУТЫМ ЧЕРЕПОМ С БОЛЬШИМИ УШАМИ. ИЗ ИХ ЧУВСТВ ЛУЧШЕ ВСЕГО РАЗВИТ СЛУХ. ОБАЯНИЕ СЛАБЕЕ, НО НЕ ОЧЕНЬ ПЛОХОЕ, ЗРЕНИЕ ДОВОЛЬНО ХОРОШЕЕ.

КАВКА́ЗСКИЙ ТЕ́ТЕРЕВ (АКХА КОТАМ)- НАСЕЛЯЕТ КУСТАРНИКОВЫЕ ЗАРОСЛИ РОДОДЕНДРОНА И ШИПОВНИКА И НЕБОЛЬШИЕ РОЩИ, ПОРОСШИЕ НИЗКОРОСЛОЙ БЕРЁЗОЙ И МОЖЖЕВЕЛЬНИКОМ. ПИТАЕТСЯ ЛЕТОМ ЦВЕТАМИ, ПОБЕГАМИ И ЛИСТЬЯМИ ТРАВ, ЯГОДАМИ, НАСЕКОМЫМИ; ЗИМОЙ ПОЧКАМИ И СЕРЁЖКАМИ БЕРЁЗ, ЯГОДАМИ, СЕМЕНАМИ

КОСУЛЯ (ЛИЙГ)- НЕБОЛЬШИЕ ОЛЕНИ. САМЦЫ ИМЕЮТ НЕБОЛЬШИЕ ДВАЖДЫ ВЕТВЯЩИЕСЯ РОГА. ОКРАСКА ЛЕТОМ ТЁМНО-РЫЖАЯ, ЗИМОЙ СЕРО-БУРАЯ, В ОБЛАСТИ ХВОСТА БЕЛОЕ ПЯТНО; ХВОСТ ОЧЕНЬ МАЛ. ОТЛИЧАЮЩАЯСЯ БОЛЕЕ КРУПНЫМИ РАЗМЕРАМИ (ВЫСОТА В ПЛЕЧАХ БОЛЕЕ 80 СМ) И БОЛЬШИМИ, ШИРОКО РАССТАВЛЕННЫМИ, СИЛЬНО БУГОРЧАТЫМИ РОГАМИ. КОСУЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕННЫМ ОХОТНИЧЬИМ (В СИБИРИ ПРОМЫСЛОВЫМ) ЖИВОТНЫМ. ОБИТАЕТ В ЛИСТВЕННЫХ И СМЕШАННЫХ ЛЕСАХ И В ОТКРЫТЫХ МЕСТНОСТЯХ ПО КУСТАРНИКАМ, ТИПИЧНА ДЛЯ ЛЕСОСТЕПИ, В ГОРАХ ПОДНИМАЕТСЯ ДО ПОЛОСЫ ВЕЧНЫХ СНЕГОВ.

КОБЧИК (КЕР)— ВИД ХИЩНЫХ ПТИЦ РОДА СОКОЛОВ. ПИТАЕТСЯ ПОЧТИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КРУПНЫМИ НАСЕКОМЫМИ — СТРЕКОЗАМИ, ЖУКАМИ, КУЗНЕЧИКАМИ И ПР. ИЗРЕДКА ЛОВИТ МЕЛКИХ ГРЫЗУНОВ, ЯЩЕРИЦ. ИЗ ПТИЦ ОХОТИТСЯ, В ОСНОВНОМ, НА ВОРОБЬЁВ, НО МОЖЕТ ЗАГНАТЬ И БОЛЕЕ КРУПНУЮ ПТИЦУ, КАК ГОЛУБЬ. ОХОТЯТСЯ ДНЕМ, ВОПРЕКИ ЛАТИНСКОМУ ВИДОВОМУ НАЗВАНИЮ «VESPERTINUS» — «ВЕЧЕРНИЙ». ГНЕЗДЯТСЯ В БРОШЕННЫХ ГНЁЗДАХ ВРАНОВЫХ, ИНОГДА В ДУПЛАХ, НИШАХ ИЛИ НОРАХ. МОЖЕТ ОБРАЗОВЫВАТЬ КОЛОНИИ ДО 100 ПАР. ПРИЛЕТАЮТ С ЗИМОВКИ В МАЕ, ОТЛЕТ РАННИЙ (В АВГУСТЕ). РАЗМНОЖАЮТСЯ ПОЗДНО, ЧТО СВЯЗАНО С ПЕРИОДОМ РАЗМНОЖЕНИЯ САРАНЧИ И ДРУГИХ КРУПНЫХ НАСЕКОМЫХ. МИГРИРУЮТ, В ОТЛИЧИЕ ОТ БОЛЬШИНСТВА СОКОЛОВ, СТАЯМИ.

КАБАН (АКХА ХЬАКХА) — МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ ИЗ ОТРЯДА ПАРНОКОПЫТНЫХ, ПОДОТРЯДА СВИНООБРАЗНЫХ . ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДКОМ ДОМАШНЕЙ СВИНЬИ. КАБАН — ВСЕЯДНОЕ ПАРНОКОПЫТНОЕ НЕЖВАЧНОЕ МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ ИЗ РОДА СВИНЕЙ (SUS). ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДОМАШНЕЙ СВИНЬИ, КОТОРАЯ НЕСОМНЕННО ПРОИЗОШЛА ОТ КАБАНА (И ДРУГИХ БЛИЗКИХ ВИДОВ), ОБЛАДАЕТ БОЛЕЕ КОРОТКИМ И ПЛОТНЫМ ТЕЛОМ, БОЛЕЕ ТОЛСТЫМИ И ВЫСОКИМИ НОГАМИ; КРОМЕ ТОГО, ГОЛОВА У КАБАНА ДЛИННЕЕ И ТОНЬШЕ, УШИ ДЛИННЕЕ, ОСТРЕЕ И ПРИТОМ СТОЯЧИЕ, ОСТРЫЕ, КЛЫКИ У САМЦА ГОРАЗДО БОЛЕЕ РАЗВИТЫ, ЧЕМ У САМКИ. КАБАН ДЕРЖИТСЯ В БОГАТЫХ ВОДОЙ, БОЛОТИСТЫХ МЕСТНОСТЯХ, КАК ЛЕСИСТЫХ, ТАК И ЗАРОСШИХ КАМЫШОМ И КУСТАРНИКОМ И Т. П. СТАРЫЕ САМЦЫ ЖИВУТ В ОСНОВНОМ ПООДИНОЧКЕ И ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ К СТАДАМ ЛИШЬ ВО ВРЕМЯ СПАРИВАНИЯ. САМКИ ОБРАЗУЮТ ОБЫКНОВЕННО НЕБОЛЬШИЕ СТАДА ИЗ 10—30 САМОК, ДЕТЕНЫШЕЙ, МОЛОДЫХ И СЛАБЫХ САМЦОВ.

КУРОПАТКА (МОАШ) – ЯВЛЯЮТСЯ ОСЕДЛЫМИ ПТИЦАМИ, ЖИВУТ В ОТКРЫТОЙ МЕСТНОСТИ. ПИТАЮТСЯ РАЗНООБРАЗНЫМИ СЕМЕНАМИ, ИНОГДА НАСЕКОМЫМИ. ГНЁЗДА УСТРАИВАЮТ НА ЗЕМЛЕ В ВИДЕ ВЫСТЛАННЫХ УГЛУБЛЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В УКРОМНЫХ МЕСТАХ.

ЛЕСНОЙ КОТ (ХЬУН ЦИСК)-ХИЩНОЕ МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ ИЗ СЕМЕЙСТВА КОШАЧЬИХ. ЛЕСНЫЕ КОШКИ ОЧЕНЬ ПУГЛИВЫ, ЗАЧАСТУЮ АГРЕССИВНЫ И СТАРАЮТСЯ НЕ ПРИБЛИЖАТЬСЯ К ПОСЕЛЕНИЯМ ЛЮДЕЙ. ОНИ ВЕДУТ ОДИНОЧНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И УДЕРЖИВАЮТ ТЕРРИТОРИЮ ОКОЛО 3 КМ².ОНА ПОСЕЛЯЕТСЯ ТАМ, ГДЕ НЕТ НЕДОСТАТКА В ЗАЙЦАХ, КРОЛИКАХ И ПТИЦАХ, ГНЕЗДЯЩИХСЯ НА ЗЕМЛЕ. ЛИШЬ В НЕМНОГИХ СЛУЧАЯХ ЕЙ УДАЕТСЯ ПОЙМАТЬ ДЕТЁНЫША ОЛЕНЯ ИЛИ КОСУЛИ И ТО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЗВЕРИ БЫЛИ ОСЛАБЛЕНЫ И НЕ МОГЛИ СКРЫТЬСЯ. В ГОДЫ, КОГДА ЧУВСТВУЕТСЯ НЕДОСТАТОК ПИЩИ, КОШКИ ОХОТЯТСЯ ПООДИНОЧКЕ. СУЩЕСТВУЮТ НЕСКОЛЬКО ПОДВИДОВ, ОБИТАЮЩИХ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ.

КРОЛИКИ (КУ`НИ) ЧЁТКО ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ЗАЙЦЕВ В ПЛАНЕ СВОЕЙ АЛЬТРИЦИАЛЬНОСТИ — ИХ ДЕТЁНЫШИ РОЖДАЮТСЯ СЛЕПЫМИ И ЛЫСЫМИ. ДЕТЁНЫШИ ЗАЙЦЕВ ЖЕ, РОЖДАЮТСЯ УЖЕ С ШЕРСТЬЮ И СО СПОСОБНОСТЬЮ ВИДЕТЬ. ВСЕ КРОЛИКИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АМЕРИКАНСКОГО КРОЛИКА, ЖИВУТ В ПОДЗЕМНЫХ НОРАХ, ЧАСТО ГЛУБОКИХ И СЛОЖНЫХ; В ТО ВРЕМЯ КАК ЗАЙЦЫ ЖИВУТ В ПРОСТЫХ ГНЁЗДАХ, КОТОРЫЕ РАСПОЛОЖЕНЫ НА ЗЕМЛЕ (ТАК ЖЕ ДЕЛАЮТ И АМЕРИКАНСКИЕ КРОЛИКИ). ЗАЙЦЫ, ВДОБАВОК, ОБЫЧНО НЕ ЖИВУТ ГРУППАМИ. ЗАЙЦЫ В ЦЕЛОМ БОЛЬШЕ ЧЕМ КРОЛИКИ, ИХ УШИ ДЛИННЕЕ, И ОНИ ИМЕЮТ НА СВОЁМ МЕХЕ ЧЁРНЫЕ ОТМЕТКИ. ЗАЙЦЫ ДО СИХ ПОР НЕ ПРИРУЧЕНЫ — КРОЛИКИ ЖЕ ЧАСТО ВЫСТУПАЮТ В КАЧЕСТВЕ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ. КРОЛИКИ СПАСАЮТСЯ ОТ ХИЩНИКОВ ВЫРЫВАЯ НОРУ, УПРЫГИВАЯ ПРОЧЬ В ЗИГЗАГООБРАЗНОЙ МАНЕРЕ; В СЛУЧАЕ ЕСЛИ КРОЛИКА СХВАТИЛИ, ОН НАНОСИТ СХВАТИВШЕМУ МОЩНЫЙ ПИНОК ЗАДНИМИ ЛАПАМИ. СИЛЬНЫЕ, КРЕПКИЕ ЗУБЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ КРОЛИКАМ ЭФФЕКТИВНО КУСАТЬСЯ, ТАКЖЕ ПОМОГАЮТ ИМ ВЫРВАТЬСЯ.

ЛИСА (ЦОГАЛ) – ОДНО ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ, ЖИВУЩИХ У НАС В ЕВРОПЕ. ОСЕНЬЮ И ЗИМОЙ, ОСОБЕННО В ПЛОСКИХ МЕСТНОСТЯХ, ЛИСИЦА ЧАСТО ЖИВЕТ ПОД КУЧЕЙ ХВОРОСТА ИЛИ ПОД КАМНЯМИ. ЛИСИЦА ОХОТНЕЕ ВСЕГО ОТПРАВЛЯЕТСЯ ЗА ДОБЫЧЕЙ ПО НОЧАМ, А В СПОКОЙНЫХ МЕСТАХ ОХОТИТСЯ И ДНЕМ. ДОБЫЧЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ КОСУЛЯ, ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ, МАЙСКИЙ ЖУК, ЗАЙЦЫ, КРОЛИКИ, ОЛЕНИ, МЫШИ.

ЛАСТОЧКА (Ч1АГАРГ)) – МАЛЕНЬКАЯ ПЕРЕЛЁТНАЯ ПТИЦА. ОТЛИЧАЕТСЯ ДЛИННЫМ ХВОСТОМ С ГЛУБОКИМ РАЗРЕЗОМ В ФОРМЕ ВИЛКИ, И ИЗОГНУТЫМИ, ДЛИННЫМИ ОСТРЫМИ КРЫЛЬЯМИ. ЛЕГКО АДАПТИРУЮТСЯ К РАЗЛИЧНЫМ УСЛОВИЯМ, ГДЕ ИМЕЕТСЯ ДОБЫВАЕМЫЙ КОРМ, ИСТОЧНИК ВОДЫ И МЕСТО ДЛЯ ГНЕЗДОВАНИЯ, ОБЫЧНО НАВИСАЮЩАЯ ЧАСТЬ СКАЛЫ ИЛИ ЗДАНИЯ, ПОД КОТОРОЙ ОНИ И СТРОЯТ СВОЁ ГНЕЗДО В МЕСТАХ, НЕДОСЯГАЕМЫХ ДЛЯ ДОЖДЯ. ЧАСТО ИХ МОЖНО УВИДЕТЬ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ГДЕ ОНИ СЕЛЯТСЯ ВОЗЛЕ АМБАРОВ И ДРУГИХ СЛУЖЕБНЫХ ПОСТРОЕК. ОНИ ТАКЖЕ СТРОЯТ СВОИ ГНЁЗДА ПОД МОСТАМИ, ПОД КАРНИЗАМИ ДОМОВ. ПИТАЮТСЯ ДЕРЕВЕНСКИЕ ЛАСТОЧКИ НАСЕКОМЫМИ: МУХИ, КУЗНЕЧИКИ, СВЕРЧКИ, СТРЕКОЗЫ, ЖУКИ И ДРУГИЕ ЛЕТАЮЩИЕ НАСЕКОМЫЕ СОСТАВЛЯЮТ 99 % ИХ РАЦИОНА. СВОЮ ДОБЫЧУ ОНИ В ОСНОВНОМ ЛОВЯТ В ПОЛЁТЕ, И НА ЛЕТУ СПОСОБНЫ КОРМИТЬ СВОИХ ПТЕНЦОВ.

МЫШЬ (ДАХКИЛГ) –МЫШИ АКТИВНЫ В СУМЕРКАХ И НОЧЬЮ. БОЛЬШИНСТВО ВЕДЁТ ПОЛУНАЗЕМНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ПИТАЯСЬ СЕМЕНАМИ, ЧАСТЬ — ЖИВОТНОЙ ПИЩЕЙ. НЕКОТОРЫЕ —СИНАНТРОПНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (ДОМОВАЯ МЫШЬ, НЕКОТОРЫЕ КРЫСЫ). РАЗМНОЖАЮТСЯ В ТЁПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА, В ЖИЛИЩАХ ЧЕЛОВЕКА — КРУГЛОГОДИЧНО. ПОЛОВОЗРЕЛЫМИ СТАНОВЯТСЯ В 1,5—3 МЕСЯЦА.
ПРИРОДНЫЕ НОСИТЕЛИ БОЛЬШОГО ЧИСЛА ПАРАЗИТОВ И ХРАНИТЕЛИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ МНОГИХ БОЛЕЗНЕЙ ЧЕЛОВЕКА И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, ВКЛЮЧАЯ ОПАСНЫЕ ИНФЕКЦИИ. ВРЕДЯТ ЗЕРНОВОМУ И ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ПОВРЕЖДАЮТ МАТЕРИАЛЫ И ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. НАИБОЛЬШИЙ ВРЕД ПРИНОСИТ ДОМОВАЯ МЫШЬ . МЕРЫ БОРЬБЫ: ЛИКВИДАЦИЯ ДОСТУПА К ПРОДУКТАМ, ОТПУГИВАНИЕ (УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ: МЫШИ СЛЫШАТ УЛЬТРАЗВУК ДО ЧАСТОТ ПОРЯДКА 40 КГЦ), РЕГУЛЯЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ЛОВУШЕК (МЫШЕЛОВОК) И ЯДОВ.

МЕДВЕДЬ (ЧА) – МЕДВЕДИ ВСЕЯДНЫ, ХОРОШО ЛАЗАЮТ И ПЛАВАЮТ, БЫСТРО БЕГАЮТ, МОГУТ СТОЯТЬ И ПРОХОДИТЬ КОРОТКИЕ РАССТОЯНИЯ НА ЗАДНИХ ЛАПАХ. ИМЕЮТ КОРОТКИЙ ХВОСТ, ДЛИННУЮ И ГУСТУЮ ШЕРСТЬ, А ТАКЖЕ ОТЛИЧНЫЕ ОБОНЯНИЕ. ОХОТЯТСЯ ВЕЧЕРОМ ИЛИ НА РАССВЕТЕ. ОБЫЧНО БОЯТСЯ ЧЕЛОВЕКА, НО МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫМИ В ТЕХ МЕСТАХ, ГДЕ ОНИ ПРИВЫКЛИ К ЛЮДЯМ, ОСОБЕННО БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ И МЕДВЕДЬ ГРИЗЛИ. НЕВОСПРИИМЧИВЫ К ПЧЕЛИНЫМ УКУСАМ. В ПРИРОДЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ВРАГОВ ПОЧТИ НЕ ИМЕЮТ. НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД МЕДВЕДИ ДОВОЛЬНО МЕДЛИТЕЛЬНЫ И НЕУКЛЮЖИ, ОДНАКО НА ДЕЛЕ СПОСОБНЫ ДОВОЛЬНО БЫСТРО БЕГАТЬ (ДО 50 КМ/Ч), ЛАЗАТЬ, ПОДНИМАТЬСЯ НА ЗАДНИЕ ЛАПЫ; НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ПРЕКРАСНО ПЛАВАЮТ. ОСТРОТА ЗРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СРАВНИМА С ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ. РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫЙ БАРИБАЛ ОБЛАДАЕТ ЦВЕТОВЫМ ЗРЕНИЕМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ЕМУ РАЗЛИЧАТЬ ПО ЦВЕТУ СЪЕДОБНЫЕ ПЛОДЫ И ОРЕХИ. ОДНАКО НАИБОЛЕЕ РАЗВИТО У МЕДВЕДЕЙ ОБОНЯНИЕ.

ОРЛЫ́ (АЬРЗИ) — РОД КРУПНЫХ ПТИЦ СЕМЕЙСТВА ЯСТРЕБИНЫХ. ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОСТРОЕ ЗРЕНИЕ. ГНЕЗДЯТСЯ НА ЗЕМЛЕ, СКАЛАХ ИЛИ ДЕРЕВЬЯХ. ПИТАЮТСЯ МЕЛКИМИ И СРЕДНЕЙ ВЕЛИЧИНЫ ПОЗВОНОЧНЫМИ (ВЫСМАТРИВАЮТ, ПАРЯ В ВОЗДУХЕ, ИЛИ ПОДКАРАУЛИВАЮТ, СИДЯ НА ВОЗВЫШЕННОМ МЕСТЕ), ИНОГДА ПАДАЛЬЮ. ОХОТИТСЯ НА РАЗНООБРАЗНУЮ ДИЧЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ И КРУПНУЮ, ЛЕГКО ПРИСПОСАБЛИВАЯСЬ К УСЛОВИЯМ В ДАННОЙ МЕСТНОСТИ И В ОПРЕДЕЛЁННОЕ ВРЕМЯ ГОДА. НЕРЕДКО В РАЦИОНЕ ДОМИНИРУЮТ СУРКИ, СУСЛИКИ, ЗАЙЦЫ, ХОРЬКИ, СКУНСЫ, ЧЕРЕПАХИ . ИНОГДА НАПАДАЕТ НА ЖИВОТНЫХ, ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВОСХОДЯЩИХ ЕГО ПО ВЕСУ И РАЗМЕРАМ, ОСОБЕННО БОЛЬНЫХ ИЛИ ДЕТЁНЫШЕЙ — БЛАГОРОДНЫХ ОЛЕНЕЙ, КОСУЛЬ, СЕРН, ОВЕЦ.

РЫСЬ (AЬKXA ЦИСК) - ОТДАЕТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ГЛУХИМ ТЕМНОХВОЙНЫМ ЛЕСАМ, ТАЙГЕ. ОНА ОТЛИЧНО ЛАЗАЕТ ПО ДЕРЕВЬЯМ И СКАЛАМ, ХОРОШО ПЛАВАЕТ. ТАКЖЕ ОНА ОТЛИЧНО ВЫЖИВАЕТ СРЕДИ СНЕГОВ (ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ), ЛОВЯ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ. ПЯТНИСТОСТЬ ШЕРСТИ ДЕЛАЕТ РЫСЬ НЕЗАМЕТНОЙ ДНЕМ СРЕДИ ПАДАЮЩИХ НА ЗЕМЛЮ СОЛНЕЧНЫХ БЛИКОВ ОТ ОСВЕЩЕННЫХ КРОН ДЕРЕВЬЕВ И СКРЫВАЕТ В СУМЕРКАХ И НА ЗАРЕ, ОБЛЕГЧАЯ НАПАДЕНИЕ НА ДОБЫЧУ.
ПРИ ОБИЛИИ ПИЩИ РЫСЬ ЖИВЁТ ОСЕДЛО, ПРИ НЕДОСТАТКЕ — КОЧУЕТ. В СУТКИ ОНА СПОСОБНА ПРОХОДИТЬ ДО 30 КИЛОМЕТРОВ. ОСНОВУ ЕЁ РАЦИОНА СОСТАВЛЯЮТ ЗАЙЦЫ. ТАКЖЕ ОНА ПОСТОЯННО ОХОТИТСЯ НА ТЕТЕРЕВИНЫХ ПТИЦ, МЕЛКИХ ГРЫЗУНОВ, РЕЖЕ — НЕБОЛЬШИХ КОПЫТНЫХ, ВРОДЕ КОСУЛИ, КАБАРГИ, ПЯТНИСТОГО И СЕВЕРНОГО ОЛЕНЕЙ, ИЗРЕДКА НАПАДАЕТ НА ДОМАШНИХ КОШЕК И СОБАК, КРОМЕ ТОГО — НА ЛИС, ЕНОТОВИДНЫХ СОБАК И ДРУГИХ НЕКРУПНЫХ ЗВЕРЕЙ. ГЛАВНЫМ КОРМОВЫМ ОБЪЕКТОМ ДЛЯ НЕЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЗАЙЦЫ-БЕЛЯКИ. КРОМЕ ТОГО, РЫСЬ НАПАДАЕТ НА КУРОПАТОК, РЯБЧИКОВ, ЛИСИЦ, БОБРОВ, МЕЛКИХ ГРЫЗУНОВ, МОЛОДНЯК ДИКИХ КАБАНОВ, ЛАНЕЙ, ЛОСЕЙ.

ТУР (СОСАКХ)- ПРЕВОСХОДНО ЛАЗАЮТ ПО ГОРАМ С БОЛЬШОЙ СИЛОЙ И ВЫНОСЛИВОСТЬЮ; ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫ, НО ИНОГДА ПРОЯВЛЯЮТ БОЛЬШУЮ ОТВАГУ. КОЗЛЫ ЖИВУТ СЕМЬЯМИ ИЛИ МАЛЕНЬКИМИ СТАДАМИ, РЕДКО СОБИРАЯСЬ В ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СТАДА. РАЗМЕРЫ СТАД ИЗМЕНЯЮТСЯ ПО ВРЕМЕНАМ ГОДА, ОБЫЧНО НАИБОЛЕЕ ВЕЛИКИ ОНИ В ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ. В МЕСТАХ, ГДЕ КОЗЛЫ МНОГОЧИСЛЕННЫ, ИХ СТАДА МОГУТ СОСТОЯТЬ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ СОТЕН ГОЛОВ.
ЛЕТОМ ЖИВУТ ВЫСОКО В ГОРАХ, ЗИМОЙ, ИЗБЕГАЯ ГЛУБОКИХ СНЕГОВ, ЗАТРУДНЯЮЩИХ ДВИЖЕНИЕ И ДОБЫВАНИЕ ПИЩИ, СПУСКАЮТСЯ НИЖЕ. ПАСУТСЯ ОБЫЧНО В УТРЕННИЕ И ВЕЧЕРНИЕ ЧАСЫ, ПРОВОДЯ ЖАРКОЕ ВРЕМЯ ДНЯ НА ОТДЫХЕ.
ТАМ, ГДЕ ИНТЕНСИВНО ВЕДЁТСЯ ОХОТА НА КОЗЛОВ, ОНИ ВЫХОДЯТ НА ПАСТБИЩА ПО НОЧАМ, УКРЫВАЯСЬ ДНЁМ В НЕДОСТУПНЫХ МЕСТАХ.
ДОМАШНИЕ КОЗЛЫ РАСПРОСТРАНЕНЫ ТЕПЕРЬ ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ, ОСОБЕННО В ГОРИСТЫХ МЕСТНОСТЯХ, НЕПРИГОДНЫХ ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ. ОНИ ПРЕКРАСНО ЛАЗАЮТ, ВЗБИРАЮТСЯ ДАЖЕ НА СИЛЬНО РАЗВЕТВЛЁННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И МОГУТ ПАСТИСЬ В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДРУГОГО СКОТА.

УТКА (БОАБИШК)- ДЕРЖИТСЯ В ОДИНОЧКУ, ПАРАМИ И СТАЯМИ НА ВОДЕ ИЛИ У ВОДЫ. ПОЛЁТ БЫСТРЫЙ, ОЧЕНЬ ШУМНЫЙ. ВЗМАХИ КРЫЛЬЕВ СОПРОВОЖДАЮТСЯ ЧАСТЫМИ ЗВОНКИМИ ЗВУКАМИ «ВИТЬ-ВИТЬ-ВИТЬ-ВИТЬ», ПО КОТОРЫМ КРЯКВУ МОЖНО ОТЛИЧИТЬ ДАЖЕ НЕ ВИДЯ ЛЕТЯЩЕЙ ПТИЦЫ. У ЛЕТЯЩЕЙ ПТИЦЫ ЧЁТКО ВЫДЕЛЯЮТСЯ БЕЛЫЕ ПОЛОСКИ НА КРЫЛЕ, ОКАЙМЛЯЮЩИЕ ЗЕРКАЛО. С ВОДЫ ПОДНИМАЕТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЛЕГКО. НЫРЯЕТ ТОЛЬКО БУДУЧИ РАНЕНОЙ, СПОСОБНА ПРОПЛЫТЬ ПОД ВОДОЙ ДЕСЯТКИ МЕТРОВ. ПО ЗЕМЛЕ ХОДИТ ПЕРЕВАЛИВАЯСЬ, НО ПРИ РАНЕНИИ СПОСОБНА ПРОВОРНО БЕГАТЬ. НА БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ СВОЕГО АРЕАЛА КРЯКВА СЛУЖИТ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНОЙ, А МЕСТАМИ — ПРОМЫСЛОВОЙ ОХОТЫ. ПОСЕЩАЯ ОСЕНЬЮ ПОЛЯ ПШЕНИЦЫ, РЖИ, ОВСА, ПРОСА, ПОСЕВЫ РИСА, НЕРЕДКО НАНОСЯТ ИМ СУЩЕСТВЕННЫЙ УЩЕРБ НА УЧАСТКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПОБЛИЗОСТИ ОТ ВОДОЁМОВ. НАРЯДУ С ЭТИМ ОНИ ПРИНОСЯТ ПОЛЬЗУ, УНИЧТОЖАЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ ИЗ ЧИСЛА ПРЯМОКРЫЛЫХ И МАССОВЫМ ПОЕДАНИЕМ СЕМЯН СОРНЫХ РАСТЕНИЙ.

УДОД («ТУШОЛ-КОТАМ») — ЗАМЕТНАЯ ПТИЦА И ИЗДРЕВЛЕ УПОМИНАЕТСЯ В РАЗЛИЧНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ И СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЯХ — КОРАНЕ И БИБЛИИ. В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ, СОГЛАСНО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ДРЕВНИХ КЛАССИКОВ, ФРАКИЙСКИЙ ЦАРЬ ТЕРЕЙ, СЫН БОГА ВОЙНЫ АРЕСА И БИСТОНСКОЙ НИМФЫ, БЫЛ ПРЕВРАЩЁН В УДОДА ПОСЛЕ ТОГО КАК ПОПЫТАЛСЯ УБИТЬ СВОИХ ЖЕН. У ИНГУШЕЙ И ЧЕЧЕНЦЕВ ДО ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА УДОД СЧИТАЛСЯ СВЯЩЕННОЙ ПТИЦЕЙ И СИМВОЛИЗИРОВАЛ БОГИНЮ ВЕСНЫ, ПЛОДОРОДИЯ И ДЕТОРОЖДЕНИЯ ТУШОЛИ. УБИТЬ УДОДА МОЖНО БЫЛО ЛИШЬ С РАЗРЕШЕНИЯ ЖРЕЦА ДЛЯ РИТУАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ, А ЕГО ГНЕЗДО ВО ДВОРЕ СЧИТАЛОСЬ ХОРОШЕЙ ПРИМЕТОЙ. ОСНОВУ ПИТАНИЯ УДОДА СОСТАВЛЯЮТ МЕЛКИЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ: НАСЕКОМЫЕ, ИХ ЛИЧИНКИ И КУКОЛКИ, ПАУКИ, МОКРИЦЫ, МНОГОНОЖКИ, МЕЛКИЕ МОЛЛЮСКИ И Т. П. РЕЖЕ ЛОВИТ МЕЛКИХ ЛЯГУШЕК, ЯЩЕРИЦ И ЗМЕЙ.

ФИЛИН (МИККХАЛ)— ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ ШИРОКО РАСПРОСТРАНЁННЫХ ВИДОВ СОВ. ФИЛИН — НОЧНОЙ ОХОТНИК. ОН ВЫХОДИТ НА ОХОТУ В СУМЕРКАХ, ОКОЛО ПОЛУНОЧИ ДЕЛАЕТ ПЕРЕРЫВ, А ЗАТЕМ ПРОДОЛЖАЕТ ОХОТУ ДО РАССВЕТА. В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ ОХОТИТСЯ, ТОЛЬКО ЕСЛИ ГОЛОДЕН.

ВО ВРЕМЯ ОХОТЫ НА НАЗЕМНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ФИЛИН ВЫСЛЕЖИВАЕТ ИХ, ПЛАНИРУЯ НАД ЗЕМЛЁЙ НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ. В ПОГОНЕ ЗА ПТИЦАМИ ЛЕТИТ НАД ВЕРШИНАМИ ДЕРЕВЬЕВ. ПРИ ОХОТЕ НА ПТИЦ МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ, И ПРИ ЭТОМ ДОСТАТОЧНО МАНЁВРЕННЫЙ ДЛЯ ОХОТЫ В ГУСТЫХ КРОНАХ ДЕРЕВЬЕВ. ФИЛИН СПОСОБЕН ДОГОНЯТЬ ЛЕТЯЩИХ ВОРОН, ГОЛУБЕЙ, ГУСЕЙ, ОДНАКО ПРЕДПОЧИТАЕТ СИДЯЩУЮ НА МЕСТЕ ДОБЫЧУ.

КРОМЕ ТОГО, ФИЛИН ОХОТИТСЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ: В ЧАСТНОСТИ, МОЖЕТ ПОЙМАТЬ УБЕГАЮЩУЮ МЫШЬ, А ТАКЖЕ ПИТАЕТСЯ УЛИТКАМИ, ЧЕРВЯМИ И ДРУГИМИ БЕСПОЗВОНОЧНЫМИ. В ПРИБРЕЖНЫХ РАЙОНАХ МОРЕЙ ФИЛИНЫ ПОЕДАЮТ КРАБОВ И РЫБУ.

ХОМЯКИ (ЭП)– ОДИНОЧНЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ, ЯРОСТНО ОТСТАИВАЮЩИЕ СВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧАСТОК. У САМЦОВ УЧАСТОК МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 12 ГА. ОБЫЧНО У НИХ МЯГКИЙ МЕХ, КРУГЛАЯ МОРДОЧКА, БОЛЬШИЕ ГЛАЗА. ХОМЯК ОЧЕНЬ УМЕЛО ПОЛЬЗУЕТСЯ ПЕРЕДНИМИ ЛАПАМИ: ПОДНОСИТ ПИЩУ КО РТУ, ДЕРЖИТ И ВЕРТИТ КОЛОСЬЯ, ИМИ ЖЕ ПРИВОДИТ В ПОРЯДОК СВОЙ МЕХ. ВНЕШНИЕ ЧУВСТВА РАЗВИТЫ ДОВОЛЬНО РАВНОМЕРНО. ОН ЗАЩИЩАЕТСЯ ПРОТИВ ВСЯКОГО НАПАДАЮЩЕГО НА НЕГО ЖИВОТНОГО ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ОН В СИЛАХ.

ШАКАЛ (Ц1УЗИ)- ДРЕВНИЕ НАЗЫВАЛИ ЕГО «ФОС» И «ЗОЛОТОЙ ВОЛК». ТУЛОВИЩЕ СТРОЙНОЕ, НОГИ ВЫСОКИЕ, МОРДА ОСТРЕЕ, ЧЕМ У ВОЛКА, ПУШИСТЫЙ ХВОСТ. ПИТАЮТСЯ МЕРТВЫМИ РЫБАМИ, МОЛЛЮСКАМИ И ПРОЧИМИ ЖИВОТНЫМИ. НА ЧЕРЕПЕ ИНОГДА ВСТРЕЧАЕТСЯ КОСТЯНОЙ НАРОСТ, КОТОРЫЙ СНАРУЖИ ОБОЗНАЧЕН ПУЧКОМ ДЛИННЫХ ВОЛОС.. НАЗЫВАЕТСЯ ОН – ШАКАЛИЙ РОГ. ИНДУСЫ И СИНГАЛЕЗЦЫ ПРИПИСЫВАЮТ ЕМУ ЧУДОДЕЙСТВЕННУЮ СИЛУ.

ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ НАУЧНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ ЗА РЯД УТОЧНЕНИЙ И ПОПРАВОК, А ТАКЖЕ МАМЕ, ЗА ПРОЯВЛЕННОЕ СОДЕЙСТВИЕ, ТЕРПЕНИЕ И ПОДДЕРЖКУ.